NEUE CHALASTOGASTRA-ARTEN (Hym.).

Beschrieben von Fr. W. Konow in Teschendorf.

Herr A. Mocsáry hat die Güte gehabt, die interessanten Schätze, welche das Ungarische National-Museum an exotischen *Chalastogastra* besitzt, mir zur Bestimmung, beziehungsweise zur Beschreibung anzuvertrauen, wofür ich demselben hiermit meinen verbindlichsten Dank sage. Arten, von denen nur singuläre Exemplare vorliegen, pflege ich nicht zu beschreiben, so dass einige Arten noch unbestimmt im Besitz des National-Museum bleiben müssen, bis sich reichlicheres Material findet. Dagegen habe ich mir erlaubt, der Vollständigkeit wegen, die Beschreibung weniger Arten hinzuzufügen, die sich in meiner eigenen Sammlung befinden.

1. Gen. *Chalinus* Knw.

In Természetrajzi Füzetek, Vol. XX 1897 p. 605 habe ich die Gattung *Chalinus* gegründet, ohne eine bestimmte Gattungs-Diagnose aufstellen zu können. Da das Ungarische National-Museum ein weibliches Exemplar des *Ch. plumicornis* Guér. besitzt, so kann ich hier folgende Gattungsdiagnose nachträglich geben:

Corpus elongatum, cylindricum; caput magnum, thorace latius: fronte non nisi inferne supra antennas acute marginata, medio 2 carinis longitudinalibus antice convergentibus ornata; carinis debilibus, in media orbita interiore orientibus; frontis dimidia parte superiore utrobique 3 tuberculis maioribus, acutis ornata, superne subcrenulato-cristata et oculos longius superante, medio depressa; clypeo occulto; antennis crassis, pilosis; ocellis superioribus in oculorum orbita longius sub linea oculos tangente positis; scutellum sulco debili a mesonoto separatum; tibiæ posticæ postice denticulatæ; alarum stigma breve, latitudine sua parum longius, radium e medio emittens; cellula discoidali subcostam attingente; cubito pone nervum medium fere interrupto; area humerali petiolata.

2. Gen. *Labidarge* Knw.

Von *L. Braunsi* habe ich in Entom. Nachrichten 1899 p. 311 nur das ♀ beschreiben können. Das National-Museum besitzt ein Männchen

dieser Art, das dem Weibchen entspricht und nur etwas dunkler gefärbt ist: die Mitte des Pronotum und der Mittellappen des Mesonotum vorne zur Hälfte, die Vorderbrust, die Metapleuren und der hintere Theil der Mesopleuren, sowie die Hüften und Trochanteren sind schwarz; Flügelschuppen und Mittelbrust schwarzbraun; die Fühler sind etwas länger als der Hinterleib. Von der ähnlichen *L. geniculata* Kl. ♂ unterscheidet sich dies Männchen durch viel längere und dickere Hintertibien, sowie durch die rothen Schenkel, die bei *geniculata* bis auf die Knie schwarz sind.

3. Gen. *Stelidarge* n. g.

Argidum genus. Corpus elongato-ovatum; caput mediocre, pone oculos non angustatum; palpis maxillaribus minus elongatis, crassiusculis; clypeo a fronte discreto; facie infera medio carinata; antennis longis, gracilibus, feminæ undique pilosis; fronte sulco utrobique acute marginato ornata; ocello inferiore in linea oculos tangente posito; pronotum postice profunde et anguste excisum; alæ mediocres; omnes cellula appendiculata præditæ; superiores 4 cellulis cubitalibus instructæ; cellula secunda cubitali 3ª longiore; nervo discoidali parum a cubiti origine remoto, a nervo primo mediali minus divergente; nervo 2° mediali fere interstitiali; area humerali petiolata; tibiæ posteriores crassiusculæ, longa spina supraapicali ornatæ; feminæ vagina mediocris; fere forcipiformis.

1. **St. diptycha** n. sp. ♀. — Dilute rufa; capite, abdominis apice, pedum posteriorum genibus, tibiis, tarsis nigris; tarsis anticis nigricantibus; alis fuscis; inferioribus medio dilutioribus, fere limpidis; venis nigris; stigmate nigricante, basi magis minusve lutescente.

Elongato-ovata; capite nigro-, mesonoto fusco-, mesopleuris luteo-pilosulis; hoc pone oculos non angustato; clypeo brevi, depresso, postice acute marginato; antennis abdomen longitudine æquantibus, nigro-pilosulis; articulo tertio apicem versus subdilatato et subcompresso; vertice longitudine sua fere duplo latiore; tibiis tarsisque posterioribus nigro-pilosis; vagina cano-pilosa. — Long. 9—10 mm.

Patria: *Brasilia*. (Mus. Hung.)

Die neue Gattung fällt in meiner Argiden-Tabelle (Entom. Nachrichten, 1899 p. 312 ff.) sub Nr. 3 und steht in der Mitte zwischen *Labidarge* und *Arge*. Dieselbe ist von beiden verschieden durch das gestielte Humeralfeld; der Brachius ist am Grunde einfach, nicht gespalten; von *Labidarge* ausserdem verschieden durch anderen Bau der Stirn und die beim ♀ nicht zweireihig behaarten Fühler, von *Arge* durch die niedriger stehenden Ocellen.

3. Gen. *Arge* Schrank.

1. **A. compar** n. sp. ♂ ♀. — Atro-cœrulea; alis obscure fuscis; venis et stigmate nigris.

Elongato-ovata; capite, mesonoto, mesopleuris brevissime fusco-pilosulis; capite lato, pone oculos maris rotundato-angustato, feminæ subdilatato; facie inferiore obtuse carinata; antennis longis, abdomen longitudine maris superantibus, feminæ æquantibus; articulo tertio gracili, maris apicem versus attenuato et fere acuminato, feminæ vix compresso, fere rotundato, antice obtuse carinato, apicem versus subincrassato; vertice longitudine sua vix plus quam duplo latiore. — Long. 8—10 mm.

Patria: *Japonia* (Yokohama) et *China* (Shanghai. Bokiang, Hg. Chan.).

Der *A. similis* Vollenh. sehr ähnlich und bisher offenbar damit verwechselt, aber durch die Form der Fühler sicher verschieden. Beim ♂ von *similis* sind die Fühler gleichdick und nur am äussersten Ende etwas verschmälert: beim ♀ sind sie viel dicker, von der Mitte an stark verdickt, deutlich comprimiert, vorne mit scharfem Kiel und jederseits fein und schwach gekielt. Von unserer *A. enodis* L. sind beide durch viel längere und kräftigere Fühler verschieden.

4. Gen. *Cibdela* Knw.

1. **C. scita** n. sp. ♀. — Atro-violacea; alis dilute fuscis, violascentibus; basi limpidis, sub stigmate fusco-lituratis; venis et stigmate nigris.

Subelongata, nitida; sincipite, pronoto, mesonoto, pedum tibiis fusco-, facie inferiore et mesopleuris albido-pilosulis; capite pone oculos non angustato; clypeo apice subemarginato; facie inferiore non carinata; antennis brevioribus, caput una cum thorace longitudine vix æquantibus; articulo tertio subcompresso, apicem versus subdilatato, antice acute carinato; fronte inter antennas breviter sulcatim impressa, sub ocello inferiore fere plana; vertice longitudine sua fere triplo latiore. — Long. 11—12 mm.

Patria: *Celebes* (Bua Hræng), *Lombok* (Sapit) (Mus. Hung.).

Der *C. janthina* Kl. nahe verwandt, aber viel grösser; die Fühler verhältnismässig kürzer und weniger verdickt; ferner reicht die tiefe Stirnfurche bei *janthina* bis zum unteren Nebenauge, und der Kopf ist bei *janthina* hinter den Augen mehr-weniger gerundet-verschmälert. Bei *janthina* ist manchmal das ganze Ende der Vorderflügel leicht bräunlich verdunkelt; manchmal aber ist das Ende der Flügel wasserklar, und es bleibt nur der braune Substigmaticalfleck, der sich im Radial- und Cubitalfelde mehr weniger weit ausbreitet. Diese kaum nennenswerthe Abänderung beschreibt Cameron als besondere Species unter dem Namen *Hylotoma maculi-*

pennis. Die *C. poecilotricha* Knw. von Borneo hat ganz dunkelbraune Flügel ohne Substigmaticalfleck und viel dickere Fühler, als die beiden anderen Arten.

5. Gen. *Eriglenum* n. g.

Argidum genus. Corpus oviforme; caput breve; oculis magnis, prominentibus; antennis maris bifurcis, feminæ simplicibus, longius pilosis; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; alæ mediocres; superiores 4 cellulis cubitalibus instructæ, quarum 2ª et 3ª nervos mediales excipiunt; area radiali appendiculata, apice fere rotundata, costa poststigmaticali apice fortiter curvata; nervo discoidali a cubiti origine longius remoto; nervo brachiali accessorio prope pone medii originem sito; area humerali petiolata; alæ inferiores cellula appendiculata carentes, sed nervo humerali instructæ; area humerali brevi; brachio duplo longiore; pedum tibiæ posteriores spina supraapicali non instructæ, crassiusculæ, pilosæ; feminæ vagina parva, apice hians.

1. **E. crudum** n. sp. ♂ ♀. — Nigrum; mesonoto cum scutello et mesopleurorum majore parte, rubris; mesonoti macula anteriore et tegulis nigris aut fuscis; pedum coxis et trochanteribus rufis; femoribus et tibiis anterioribus obscure fuscis, magis minusve rufescentibus; alis nigricantibus; venis nigris; stigmate fusco.

Ovatum, subdepressum; capite et thorace brevissime nigro-pilosulis; hoc pone oculos angustato; clypeo et labro fusco-pilosis, apice truncatis; antennis caput una cum thorace longitudine æquantibus, mediocribus; feminæ articulo tertio elongato-fusiformi, dense nigro-piloso; fronte inter antennas angustissima, super antennas fovea punctiformi ornata, sub ocello inferiore impressa; vertice longitudine sua sesqui latiore; alarum nervo tertio cubitali valde curvato; cellula tertia cubitali ad cubitum versus fortiter angustata; feminæ vagina tibiæ posticæ medium crassitudine vix æquante; valvulis tenuibus, apice subincurvis. — Long. 8—8,5 mm.

Patria: *Brasilia* (Mus. Hung.).

Auffällig ist bei dieser Art der etwas schräge Humeralnerv in beiden Flügeln, wie ich ihn bei anderen Argini gesehen zu haben nicht erinnere. Da aber bei fünf vorliegenden Exemplaren (1 ♂ und 4 ♀) die Flügel alle gleicherweise und in gleicher Lage diesen Nerv aufweisen, so ist eine blos individuelle Abnormität nicht wahrscheinlich. Die Art muss der mir unbekannten *Ptilia soror* Kirby täuschend ähnlich sein, ist aber durch die Gattungsmerkmale völlig verschieden.

Das neue Genus fällt in meiner Argiden-Tabelle unter Nr. 9 und unterscheidet sich von den Gattungen *Dioloceros* Curtis und *Braunsiola* durch den Brachialnerv, von der letzteren ausserdem durch die Anhangs-

zelle der Vorderflügel, von der ersteren durch die Lage der Medialnerven, die bei *Dioloceros* beide in die zweite Cubitalzelle münden. Von der Ashmead'schen Gattung *Gymnioplerus*, falls diese überhaupt eine Gattung ist, würde sich *Eriglenum* dadurch unterscheiden, dass bei jener der Discoidalnerv nicht vom Ursprung des Cubitus entfernt ist, und dass dieselbe im Hinterflügel kein Humeralfeld besitzen soll.

6. Gen. *Pilia* Lep.

1. **Pt. albipes** n. sp. ♀. — Nigra; abdomine et pedum coxis posterioribus rufis; abdominis apice inde a segmento 7° nigro; coxis anticis nigricantibus; pedibus — coxis exceptis — albis; unguiculis fuscis; alis obscure fuscis, medio subfusco-hyalinis; venis et stigmate nigris.

Elongata, nitida; capite cano-, thorace nigro-pilosulis; hoc pone oculos rotundato-angustato; palpis nigris; clypeo a fronte vix discreto, apice emarginato; antennis brevioribus, caput una cum thorace longitudine non æquantibus; articulo tertio apicem versus subangustato; fronte vix sulcatim impressa; tuberculo interantennali fortius elato, acuto; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; vertice longitudine sua fere quadruplo latiore; pedum tibiis tarsisque breviter albo-pilosis; vagina crassa, tibiæ latitudinem apicalem crassitudine æquante, apice emarginato-truncata et fusco-pilosa. — Long. 8—9,5 mm.

Patria: *Brasilia* (Espirito Santo) (Mus. Hung.).

Die Art könnte für *H. elegans* Kl. gehalten werden, welche wahrscheinlich eine *Pilia* ist; aber nach Klug's Beschreibung müssen bei dieser die Beine schwarz und nur die Schenkel gelb sein.

7. Gen. *Acidiophora* Knw.

Die *A. decora* ist in Ent. Nachrichten, 1899, XXV, p. 361 nur im männlichen Geschlechte beschrieben worden. Das National-Museum besitzt auch das entsprechende Weibchen, nach welchem die Gattungsdiagnose dahin zu berichtigen ist, dass bei dem ♀ die oberen Ocellen entschieden unter der Augentangente stehen, und dass hier auf dem Rückenschildchen ein kleines Spitzchen nicht wahrnehmbar ist.

Bei dem vorliegenden Weibchen von *A. decora* Knw. sind Pronotum und Flügelschuppen dunkel rothbraun; die äusserste Basis der Vorderflügel, sowie die Nähte der Brust, besonders die hautige Stelle unter den Flügeln hellroth; die Flügel sind noch dunkler gefärbt als beim ♂; der helle Fleck im Brachialfelde verschwindet fast ganz; und der helle binden-

artige Fleck unter dem Stigma ist mehr weniger bräunlich getrübt. Im übrigen stimmt das ♀ mit dem anderen Geschlecht völlig überein.

8. Gen. *Selandria* Leach.

1. **S. mica** n. sp. ♀. — Nigra; coxarum apice, trochanteribus, femorum basi, genibus, tibiarum annulo medio, tarsorum basi albicantibus; alis cinereo-hyalinis, apicem versus subtiliter obscuratis.

Parva, nitida; capite et mesopleuris cano-, mesonoto fusco-pubescentibus: hoc pone oculos fortiter angustato; temporibus fere nullis, postice immarginatis: antennis tenuibus, filiformibus, abdomine longioribus; articulo tertio 4° sesqui longiore, nono duos præcedentes longitudine fere æquante; fronte subrugulosa: area frontali obsoleta; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; vertice brevi, longitudine sua duplo latiore; alarum nervo primo cubitali deficiente aut obsoleto; unguiculis fere bifidis; vagina parva, subexserta, apice fusco-pilosula, a latere invisa apice late truncata. — Long. 3—4 mm.

Patria: *Singapore* (Mus. Hung.).

9. Gen. *Strombocerus* Knw.

1. **Str. Mocsáryi** n. sp. ♀. — Niger, nitidus; labro clypeique apice albidis; pronoto, mesonoto — macula apicali elongata nigra excepta — scutello, mesopleurorum superiore parte, coxis anterioribus, genuum tibiarumque anticorum latere antico, ventris basi rufescentibus vel albicantibus; coxis intermediis nigro-lituratis; alis flavescentibus; stigmate et venis substigmaticalibus flavis; ceteris venis nigris; area intercostali — apice excepto — nigra; alarum apice et superiorum fascia brevi nervum discoidalem nigrum tegente fuscis.

Elongatus; capite pone oculos fortiter angustato; temporibus brevibus; clypeo apice truncato-rotundato; antennis gracilibus, truncum longitudine fere æquantibus; nigro-pilosulis, medio subincrassatis, apice attenuatis; articulo tertio 4° breviore, quintum longitudine æquante; area pentagona impressa, ovata, antice aperta; vertice longitudine sua fere duplo latiore; alarum cellula tertia cubitali elongata, 2 anteriores longitudine fere æquante, apicem versus subdilatata; cubito mox supra basin fracto et ad nervelli instar producto; vagina subexserta, crassiuscula, breviter nigro-pilosula. — Long. 10—11 mm.

Patria: *Peru* (Callanga) (Mus. Hung.).

Durch die auffällige Zeichnung der Flügel unter allen bisher bekannten Arten dieser Gattung sehr ausgezeichnet. Leider hat an den vorliegenden Exemplaren die Färbung der hellen Körpertheile durch Cyankali

gelitten, so dass dieselbe nicht mehr sicher erkannt werden kann. Wahrscheinlich sind Pronotum und Mesonotum röthlichgelb, die hellen Stellen an Mund und Vorderbeinen aber weiss.

2. **Str. nobilis** n. sp. ♀. — Dilute flavus; antennarum flagello, sincipite, mesonoti vitta antica in lobo medio sita, lobis lateralibus, scutello, postscutello, pectore medio, abdominis apice inde a segmento septimo, tibiarum posticarum apice, tarsis posticis nigris; alis medio flavescentibus; apice poststigmaticali et superiorum fascia lata suprabasali nigro-fuscis; venis medio cum stigmate flavis, basi apiceque fuscis.

Elongato-ovatus, nitidus; sincipite et mesonoto fusco-, facie et mesopleuris luteo-pilosulis; capite pone oculos angustato; mandibularum apice brunneo; clypeo apice rotundato; antennis fusco-pilosis, medio subincrassatis, abdomine multo longioribus; articulis 2 basalibus flavis, tertio fusco; articulis 5°—8° apice subtus tuberculatim productis; ultimo tenui; fronte subelata, medio non impressa sed utrobique fovea profundiore determinata; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; vertice longitudine sua fere duplo latiore; alarum cubito supra basin curvato; vagina parva, exserta, fusco-pilosa. — Long. 9—10 mm.

Patria: *Brasilia* et *Chiriqui* (Mus. Hung.).

3. **Str. normatus** n. sp. ♀. — Niger; palpis pallidis; labro, clypeo, prothorace, tegulis, mesopleuris, scutelli apice, metathorace, adomine — apice excepto — pedum coxis, trochanteribus, femoribus pallide flavis; tibiis anticis pallidis; abdominis apice inde a segmento 6° aut 7° nigro; segmentis dorsalibus 1°—3° sæpe medio magis minusve fusco-fasciatis vel lituratis; alis pallide flavis; apice poststigmaticali fusco; superiorum macula maiore aream mediam et areae costalis et brachialis cellulæque discoidalis partem tegente nigro-fusca; venis et stigmate flavis; his apice fuscescentibus; costa, subcosta, medio, nervo discoidali, quoad macula basali obtinentur, nigris.

Elongatus, angustus, nitidus; sincipite et mesonoto fusco-, facie et mesopleuris cano-pubescentibus; capite pone oculos fortiter angustato; temporibus brevissimis; clypeo apice truncato-rotundato; antennis obscure cano-pilosulis, medio incrassatis, abdomine multo longioribus; fronte vix elata, utrobique fovea minus profunda determinata; ocellis superioribus prope sub linea oculos tangente positis; vertice longitudine sua duplo latiore; alarum cubito prope supra basin fracto; angulo acuto producto; tibiis tarsisque posterioribus nigro-pilosis; vagina parva, exserta, apice fere acuta et breviter cano-pilosula. — Long. 9 mm.

Patria: *Venezuela* (Mus. Hung.).

4. **Str. trigemmis** n. sp. ♀. — Niger; tegulis et scutello flavis; postscutello obscuriore; palpis pallidis; maxillaribus basi apiceque nigris; pedibus flavis; femoribus tibiisque anterioribus subtus fusco-striatis vel lituratis; tarsis anterio-

ribus fuscis ; pedum posticorum femoribus nigris, apicem versus dilutioribus ; alis dilute ochraceis; venis fuscis ; costa et stigmate flavis.

Elongatus, nitidus ; sincipite et mesonoto fusco-, facie et mesopleuris cano-pilosulis ; capite pone oculos non angustato ; clypeo depresso, longius fusco-piloso ; antennis validis, nigro-pilosis, medio incrassatis, abdomen longitudine fere superantibus ; fronte late sulcatim impressa ; vertice fere quadrato : alarum cubito super basin arcuato ; vagina crassiuscula, breviter cano-pilosa. — Long. 10 mm.

Patria : *Brasilia* (Mus. Hung.).

5. **Str. farctus** n. sp. ♀. — Niger; pronoti lobis lateralibus, tegulis, alarum nodulis, postscutello, abdomine — apice excepto —, pedum genibus latis ex albido flavis ; abdominis apice inde a segmento 7° nigro ; alis fusco-nigricantibus ; venis et stigmate nigris.

Brevis et crassus, nitidus ; capite, mesonoto, mesopleuris breviter fusco-pilosis ; hoc crasso, pone oculos vix angustato ; labro et clypeo longius fusco-pilosis ; illo apice truncato-rotundato ; antennis crassiusculis, brevissime fusco-pilosulis, medio subincrassatis, abdomen longitudine æquantibus ; fovea supraantennali transversa et profunda ; fronte sub ocello inferiore late impressa ; ocellis superioribus fere supra lineam oculos tangentem positis ; vertice longitudine sua sesqui latiore ; alarum cubito supra basin curvato ; vagina exserta, apice rotundata et fusco-pilosula. — Long. 11 mm.

Patria : *Ecuador*.

6. **Str. congener** n. sp. ♂ ♀. — Niger ; labro, pronoti margine posteriore, tegularum parte exteriore, episternis, coxarum apice, trochanteribus, genibus, tibiarum anteriorum latere exteriore, tibiis posticis — apice excepto — albis ; tibiarum anteriorum latere interiore basin versus angustius, tibiarum posticarum tertia parte apicali et tarsis fuscis ; abdominis segmento primo dorsali medio albo-marginato ; feminæ segmento ultimo dorsali medio albicante ; alarum dimidio basali limpido, apicali fusco-hyalino ; venis et stigmate nigro-fuscis ; costæ basi albicante.

Elongatus, nitidus ; capite et mesopleuris cano-, mesonoto fusco-pilosulis ; hoc pone oculos fortius angustato ; temporibus brevibus ; palpis elongatis, medio magis minusve albicantibus ; antennis tenuibus, medio incrassatis, brevissime nigro-pilosulis, maris abdomen longitudine superantibus, feminæ abdomine brevioribus ; articulo tertio 4° parum longiore ; fronte sub ocello anteriore vix impressa ; fovea supraantennali fere obsoleta ; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis ; vertice quadrato ; sulcis verticinis subtilibus, postice fere deletis ; alarum anticarum cubito prope super basin fracto, extus angulum acutum efficiente ; feminæ vagina vix exserta, angusta, apice nigro-pilosa. — Long. 7,5 — 9 mm.

Patria: *Lombok* (Sapit) (Mus. Hung.).

Dem *Str. fusciuervis* Cam. sehr ähnlich, durch dünnere Fühler, kürzeren Scheitel, kürzere Schläfen u. s. w. verschieden.

7. **Str. albicomus** n. sp. ♀. — Nigro-violaceus; abdominis medio (segmentis 2—6) luteo; pedum trochanteribus tibiarumque basi albidis; alarum dimidio basali limpido, apicali fuscescente.

Elongato-ovatus, nitidus; capite et thorace longius albido-pilosis; hoc pone oculos angustato; antennis crassiusculis, medio subincrassatis, fusco-pilosis, caput una cum thorace longitudine non æquantibus; articulo tertio 4° longiore; fronte plana; ocellis superioribus in linea oculos tangente positis; vertice fere quadrato, utrobique linea vix impressa determinato; alarum cubito supra basin breviter arcuato; pedum tibiis tarsisque cano-pilosis; feminæ vagina vix exserta, apice fusco-pilosula. — Long. 8—9 mm.

Patria: *Malacca (Perak)* (Mus. Hung.).

Dem *Str. pilicornis* Cam. ähnlich, aber viel kleiner, und durch die lange weisse Behaarung, die höher stehenden Ocellen und den viel kürzeren Scheitel verschieden. Der letztere ist bei *pilicornis* mehr als doppelt so lang als breit, seitlich kaum begrenzt.

10. Gen. *Canonias* n. g.

(κανονίας = procerus.)

Selandriadum genus. Corpus tenue, valde elongatum; palpi maxillares longi, tenues; clypeus apice emarginatus; antennæ graciles; articulo secundo fere quadrato; tertio 4° multo breviore; alæ angustæ, abdomen vix superantes, 4 cellulis cubitalibus instructæ; costa ante stigma subdilatata; area intercostali angustissima; cubito basi curvato; nervo discoidali prope ante cubiti originem sito; area humerali mox pone medium nervo breviore subobliquo divisa; alæ inferiores 2 cellulis mediis occlusis praeditæ; pedes tenues; unguiculis apice bifidis; tibiarum posticarum spinis brevibus, tarsi articulum 2^{um} longitudine æquantibus; metatarso elongato, tarsum reliquum longitudine multo superante; feminæ vagina brevis, occulta.

1. **C. inopinus** n. sp. ♀. — Nigro-violaceus; antennarum 2-articulis basalibus et tertii basi, tegulis, mesopleurorum angulo superiore, metapleurorum parte, ventris basi, pedum trochanteribus, genibus, tibiis, tarsorum posteriorum basi, tarsis anticis totis albidis, magis minusve flavescentibus; tibiis posticis postice fusco-lituratis; segmento 2° dorsali undique albido-marginato; alis limpidis, apice subcinereo-hyalinis; venis et stigmate nigris.

Elongatus, fere bacilliformis, nitidus; capite et thorace vix pubescentibus; hoc pone oculos angustato; palpis maxillaribus elongatis, basi nigris, medio albis, apice fuscis; antennis gracilibus, subtilissime et brevissime pilosulis, apicem versus attenuatis, abdomen longitudine superantibus; articulo primo apice incrassato; tertio basi et subtus albido, superne fusco, sextum longitudine æquante; ceteris nigris; quarto longissimo, et 3° et 5° longiore; quinto 3° sesqui longiore; 3 ultimis inter se æquilongis; area frontali discreta, utrobique acute marginata, medio cum fovea supraantennali confluente; ocellis sub linea oculos tangente positis, vertice subdepresso, medio carinato, utrobique sulcis latis et profundis determinato, longitudine sua duplo latiore. — Long. 8—9 mm.

Patria: *Java* (Mus. Hung.).

Diese Gattung kommt im Flügelgeäder ziemlich mit der zweiten Abtheilung der Gattung *Taxonus* überein, ist aber durch die langen, dünnen, spitzen Fühler und besonders durch das ungewöhnlich kurze dritte Fühlerglied sehr verschieden. In Ansehung des ganzen Körperbaues ist dieselbe als nächste Verwandte der Gattung *Strombocerus* zu bezeichnen.

11. Gen. *Eriocampa* Htg.

Von der in Wien. Ent. Zeitung, 1896 p. 51 beschriebenen *E. bilaux* ♀ besitzt das National-Museum das Männchen von *Bolivia* (S. Antonio). Dasselbe entspricht dem ♀ völlig und unterscheidet sich nur durch seinen schmalen Körper, sowie durch die Geschlechtstheile.

12. Gen. *Euphytoides* Knw.

1. **E. scurrilis** n. sp. ♂. — Nigro- et pallide flavo-variegatus; ore, antennarum articulis 2 basalibus, orbitis, verticis parte posteriore, temporum fascia supero-posteriore, pronoti marginibus et angulis posterioribus, tegulis, scutello cum pteropegis, mesopleurorum tridente, metanoti partibus elatis, ventris parte anteriore, segmentorum dorsalium limbo posteriore, ex albo flavidis; pedibus anterioribus fuscis; trochanteribus, coxarum et femorum latere superiore, tibiis tarsisque anticis antice, tibiarum intermediarum basi pallide flavidis; pedibus posticis nigris; trochanteribus posticis maxima parte pallidis; alis hyalinis; area radiali fusca, basin versus dilutiore; venis obscure fuscis; stigmate et costæ basi obscure testaceis.

Elongatus, parum nitidus; capite et thorace cano-pubescentibus; hoc crasso, pone oculos angustato; oculis magnis, subprominentibus; palpis basi pallidis; apicem versus fuscis; clypeo apice late et profunde emarginato, angulis acutis; antennis abdomen longitudine æquantibus; articulo

2° superne magis minusve fuscescente; tertio 4° longiore et quinto fuscis; quarto testaceo; ceteris nigris; fronte rugulosa, super antennas vix impressa; ocellis sub linea oculos tangente positis; vertice latitudine sua longiore; scutello quadrilateraliter pyramidato, acutiusculo; medipectoris lateribus tuberculatim elatis. — Long. 8—9,5 mm.

Patria: *Java*. (Mus. Hung.)

Das noch fehlende Weibchen wird an den plastischen Merkmalen leicht erkannt werden können.

13. Gen. *Allantus* Jur.

1. **A. largifasciatus** n. sp. ♀. — Niger; palpis nigris, maxillaribus medio albis; mandibularum latere exteriore, clypeo, pronoti angulis posterioribus, segmentorum abdominalium limbo posteriore, pedum anteriorum latere anteriore, posticorum coxis trochanteribusque albidis; alis fusco-hyalinis, superiorum area brachiali et radiali — basi excepta — et areæ cubitalis superiore parte obscure fuscis; venis nigris; costa et stigmate e fusco rufescentibus.

Elongatus, subnitidus; capite et mesonoto sparsius et brevissime, mesopleuris densius cano-pilosulis; capite et mesonoto crassius et sparsius, mesopleuris densius punctatis; capite crasso, pone oculos non angustato; labro nigro aut piceo, longius albo-piloso; clypeo antice emarginato; antennis thoracem una cum segmento primo dorsali longitudine æquantibus; articulo tertio 4° fere duplo longiore, apice subincrassato, ceteris clavam fusiformem efficientibus, inter se longitudine decrescentibus; articulo ultimo conico; vertice longitudine sua parum latiore; scutello toriformiter elato; alarum nervo radiali medio fortiter curvato: tibiis albo-pubescentibus: vagina vix exserta, cano-pilosa. — Long. 15—16 mm.

Patria: *India or.* (Sikkim) (Mus. Hung.).

Dem *A. primoris* Knw. ähnlich, aber hauptsächlich durch das nicht pyramidenförmig, sondern nur polsterförmig erhabene Rückenschildchen, sowie durch die grobe Punktirung auf Kopf und Thorax verschieden. Der *A. scrobiculatus* Knw. von Assam ist kleiner, viel dunkler gefärbt, mit breiterem Scheitel.

Analytische Tabelle der Subtrib. Lobocerotides.

1. Fühler 6-gliedrig; Vorderflügel mit 3 Cubitalzellen ... 2.
— Fühler 7—10-gliedrig ... 3.
2. Körper kurz eiförmig; Fühlergeissel dünn, deutlich dünner als die beiden Basalglieder; das 2. Fühlerglied höchstens um die Hälfte länger als dick:
1. gen. *Acordulecera* Say.

— Körper lang gestreckt; Basalglieder der Fühler nicht dicker als die Geissel; das zweite Glied mindestens doppelt so lang als dick: 2. gen. *Thulea* Say.
3. Fühler 7-gliedrig . . . . . 4.
— Fühler 8—10-gliedrig . . . . . 7.
4. Körper lang gestreckt; Fühler dicht und lang behaart; nur die Mitteltibien mit Supraapicalsporn; Vorderflügel mit 4 Cubitalzellen: 3. gen. *Loboceros* Kirby.
— Körper eiförmig; Fühler fein und kurz behaart; die 4 hintern Tibien mit oder ohne Supraapicalsporn . . . . . 5.
5. Radialfeld ohne Anhangszelle; 3 Cubitalzellen; alle Tibien ohne Supraapicalsporn . . . . . 4. gen. *Haplostegus* n. g.
— Radialfeld mit Anhangszelle: 4 Cubitalzellen . . . . . 6.
6. Körper klein; Fühlergeissel beim ♂ gegen das Ende verdickt; das letzte Glied kugelig . . . . . 5. gen. *Corynophilus* Kirby.
— Körper über 10 mm. lang; Fühlergeissel haarig, gleichdick; letztes Glied länger als dick . . . . . 6. gen. *Incalia* Cam.
7. Fühler 9—10-gliedrig . . . . . 8.
— Fühler 8-gliedrig . . . . . 9.
8. Fühler 9-gliedrig; Hinterschenkel beim ♂ stark verdickt: 7. gen. *Aulacomerus* Spin.
— Fühler 10-gliedrig; Hinterschenkel nicht verdickt: 8. gen. *Cercalces* Kirby.
9. Hintertibien mit Supraapicalsporn 9. gen. *Phylaetophaga* Frogg.
— Tibien unbewehrt . . . . . 10. gen. *Paralypia* Kirby.

1. Gen. *Acordulecerus* Say.

Man vergleiche über diese Gattung: Entom. Nachrichten, 1898, p. 250 ff.

2. Gen. *Thulea* Say.

In diese Gattung gehören ausser *nigra* Say. auch die *Perantheria bimaculata* Cam. und *P. fatima* Kirby, sowie folgende neue Art:

1. Th. nigriceps n. sp. ♀. — Lutea; capite — palpis exceptis — nigro; antennarum articulis basalibus subtus luteis; abdominis lateribus et ano nigriaiscantibus; tarsis anterioribus superne fuscis; posticorum articulo ultimo nigro; alis cinereo-hyalinis; venis fuscis; costa et stigmate luteis.

Elongata; capite nigro-, mesonoto fusco-, mesopleuris luteo-pilosulis; capite pone oculos angustato; temporibus brevissimis; oculis maximis; clypeo apice truncato; antennis thoracem longitudine superantibus, abdomine multo brevioribus, filiformibus, longius nigro-pilosis; articulo secundo 1° duplo longiore; articulo sexto præcedente fere breviore; fronte lævi, cum genis confluente, medio vix impressa; ocellis longe infra lineam oculos tangentem positis; vertice lato et longo, longitudine sua fere duplo latiore,

vage determinato; tibiarum posteriorum spina supraapicali brevi, tenui, prope supra apicem sita; vagina vix exserta, tibiae basin crassitudine æquante, apice rotundata. — Long. 7—8 mm.

Patria: *Brasilia* (S. Leopoldo).

3. Gen. *Lobaceros* Kirby.

1. **L. retusicornis** n. sp. ♀. — Flavus; capite — ore et facie inferiore antennarumque 2 articulis basalibus exceptis —, mesonoti 3 vittis magis minusve confluentibus, scutelli macula, abdominis vitta dorsali antice decurtata, postice cum ano nigro late confluente, tibiarum posticarum dimidio apicali, tarsis posticis totis nigris; metanoti medio, tarsorum anticorum apice, tarsis intermediis fere totis fuscis; alis flavescenti-hyalinis; apice poststigmaticali fusco; venis et stigmate flavis, his apice fuscis.

Elongato-ovatus; capitis parte superiore et mesonoto breviter nigro-pilosulis; facie inferiore et mesopleuris flavo-pilosulis; capite pone oculos angustato; clypeo antice rotundato-truncato; antennis longius nigro-pilosis; caput una cum thorace longitudine æquantibus, apicem versus subincrassatis; articulo septimo 6° multo breviore, apice late oblique truncato; vertice longitudine sua sesqui latiore; vagina subexserta, nigro-pilosa, superne invisa basi crassa, apicem versus celeriter angustata, fere acuminata. — Long. 9—10 mm.

Patria: *Peru* (Mus. Hung.).

Dem *L. Hippolyte* Kirby sehr ähnlich; aber dieser hat längere, gegen das Ende nicht verdickte Fühler, deren letztes Glied so lang ist, wie das vorletzte und der Scheitel ist doppelt so breit als lang.

2. **L. gibbifrons** n. sp. ♀. — Testaceus; capite — ore et frontis parte circumantennali e luteo albicantibus exceptis —, ano, tarsis intermediis, pedum posticorum tibiis tarsisque nigris; tarsis anticis et tibiis intermediis fuscis; alis lutescenti-hyalinis, apice late fuscescentibus; venis fuscis; costa — apice antestigmaticali excepto — nigra, crassa, dense nigro-pilosa; stigmate et venarum parte substigmaticali pallide flavis.

Elongatus; capitis parte superiore nigro-, thoracis dorso fusco-, mesopleuris luteo-pilosulis; capite pone oculos angustato; clypeo apice rotundato-truncato; antennis crassiusculis, longius nigro-pilosis, nigris, basi vix dilutioribus, caput una cum thorace longitudine fere æquantibus; articulo tertio minus crasso, apicem versus subincrassato, 4° sesqui longiore; articulo septimo 6° vix breviore, apice oblique truncato; frontis parte antennas sustinente tuberculatim prominente; sub ocello anteriore fronte impressa; vertice longitudine sua fere duplo latiore; tibiis et tarsis posticis

crassiusculis; dense fusco-pilosis: vagina ut in specie præcedente. — Long. 10 mm.

Patria: *Bolivia*.

Anmerkung. — Bisher sind aus der Gattung *Loboceros* nur Weibchen bekannt. Das National-Museum besitzt aber ein Männchen aus *Brasilien;* und da in dieser Gattung beide Geschlechter sehr wahrscheinlich verschieden gefärbt sind, so vermuthe ich, dass dies Männchen der Species *L. Hippolyte* Kirby angehört, da es sich durch plastische Merkmale von derselben nicht zu unterscheiden scheint. Die Grundfarbe des Körpers ist dieselbe, wie beim ♀; aber schwarz sind: der ganze Kopf mit seinen Anhängen, der Rücken des Thorax und der obere Theil der Mesopleuren sowie die Flügelschuppen, der After und an den Beinen die Tibien und Tarsen; die Vordertibien nur vorn schwarz gestreift; die Flügel sind ganz schwärzlich mit schwarzem Geäder und Stigma. Charakteristisch für die Männchen ist es, dass das 7. Fühlerglied am Ende nicht abgestutzt ist, sondern gerundet. Die Fühler sind bei dem vorliegenden Männchen etwas länger als Kopf und Thorax zusammen; und die Körperlänge beträgt 8 mm.

4. Gen. *Haplostegus* n. g.

Corpus crassiusculum, oviforme; palpi maxillares breviores, 6-articulati; articulo ultimo subelongato, præcedente longiore; antennæ 7-articulatæ, non pilosæ; articulo secundo brevi, 1° breviore; tertio apicem versus subincrassato; ceteris crassiusculis; ultimo apice subtruncato; ocelli prope sub linea oculos tangente positi; vertex crassiusculus; alarum area radialis non appendiculata, inferiorum alæ apicem attingens; cellulæ cubitales tres, nervo primo cubitali deficiente; nervo 2° mediali sive secundæ cellulæ cubitali inserto, sive interstitiali; pedum tibiæ spina supraapicali carentes; feminæ vagina apice hians.

1. **H. epimelas** n. sp. ♂ ♀. — Superne maxima parte niger, subtus flavus; capite et prothorace nigris; illo lateraliter magis minusve flavo-marginato; mesothorace, ventris parte anteriore, pedibus flavis; mesonoti 3 maculis magis minusve confluentibus, scutelli interdum litura, abdominis lateribus apiceque nigris; abdominis dorso medio et postscutello e luteo fuscis; tarsorum anteriorum et feminæ tibiarum posticarum apice tarsisque posticis fuscis; mari tibiarum posticarum dimidio apicali et tarsis posticis nigris; alis cinereo-hyalinis; venis fuscis; stigmate obscure testaceo, extra fusco-marginato.

Elongato-ovatus, nitidus; capite pone oculos vix angustato; clypei apice rotundato-truncato; antennis caput una cum thorace longitudine vix æquantibus; flagello subcompresso; articulo tertio 4° fere sesqui longiore; articulo septimo apice recte truncato, maris præcedente vix longiore, feminæ tertium longitudine fere æquante; fronte supraantennali subelata, medio longitudinaliter sulcata et prope super antennas transversim impressa; vertice longitudine sua parum latiore; maris segmento 8° dorsali

apice emarginato; feminæ vagina crassiuscula, tibiæ posticæ medium crassitudine æquante; apice pilosa et latius hiante: lateribus fere ad forcipis instar curvatis. — Long. 8—10 mm.

Patria: *Brasilia* (Minas Geræs, Espirito Santo) (Mus. Hung.).

2. **H. cataphractus** n. sp. ♀. — Niger; mesonoto — scutello excepto — et tegulis rufis; scutello, mesopleuris, pronoti lateribus, antennarum apice, pedibus fuscis, magis minusve rufescentibus; alis cinereo-hyalinis; venis et stigmate fuscis.

Breviter ovatus, nitidus; capite pone oculos subangustato; clypeo truncato; antennis thorace fere brevioribus: articulo tertio 4° fere duplo longiore; articulis 4°, 5°, 6° inter se fere æquilongis, brevibus, fere triangularibus: articulo septimo 3° vix breviore, apice truncato: fronte supra antennas foveolatim impressa; vertice longitudine sua fere duplo latiore; alarum superiorum nervo 2° mediali fere interstitiali; vagina vix exserta, tibiæ posticæ medium crassitudine æquante, apice hiante, breviter cano-pilosula. — Long. 5,5—6 mm.

Patria: *Brasilia* (Pernambuco).

3. **H. clitellarius** n. sp. ♀. — Niger; mesonoti lobis lateralibus et lobi medii apice rufis; tegulis, mesopleuris, scutello e fusco nigricantibus; alis fuscis, apicem versus dilutioribus, apice hyalinis; venis et stigmate fuscis.

Ovatus, nitidus; capite pone oculos subangustato; antennis thoracem longitudine æquantibus: articulo tertio 4° vix longiore, 7° fere breviore; articulis 4°—6° inter se fere æquilongis; ultimo apice oblique truncato; fronte vix impressa; vertice quadrato; vagina vix exserta, apice hiante et breviter cano-pilosula. — Long. 5 mm.

Patria: *Amazon* (Itaituba).

5. Gen. *Corynophilus* Kirby.

Klug nannte diese Gattung: «Cephalocera». Ausser dem *C. pumilus* Kl. ♂ aus *Brasilien* ist noch ein *C. ruficollis* Cam. von *Panama* beschrieben worden.

6. Gen. *Incalia* Cam.

Nur eine Art dieser Gattung ist bisher bekannt, die *I. hirticornis* Cam. von *Südamerika*. Der Autor beschrieb nur das Weibchen. Das zugehörige Männchen ist dem andern Geschlecht unähnlich. Die Flügel sind viel heller gefärbt, lichtbräunlich getrübt; Geäder und Stigma gelbbraun; Costa und Subcosta schwarzbraun; die erstere sehr dick, das Intercostalfeld fast ganz ausfüllend; Körper breit, mit stark deprimirtem Hinterleib,

schmutziggelb; Kopf bis auf den Mund schwarz, hinter den Augen verschmälert; Fühler dick und kurz, kaum so lang wie der Thorax; das zweite Glied etwas kürzer als das erste; das dritte doppelt so lang als das vierte; das siebente etwas länger als das vorletzte, am Ende gerundet zugespitzt; Stirn furchenartig vertieft; Ocellen ziemlich tief unter der Augentangente; Scheitel nach vorne verschmälert, um die Hälfte breiter als lang. Mesonotum grösstentheils schwarz; die Seiten und ein mit dem gleichfarbigen Schildchen zusammenhängender Fleck gelb; der After, die Endhälfte der Hintertibien und ihre Tarsen schwarz; das äusserste Ende der Mitteltibien und ihre Tarsen braun; Hintertarsen etwas comprimirt; Tibiensporne kurz und dick. — Länge 11 mm.

Das Exemplar meiner Sammlung stammt von Coary im *Amazonenstrom-Gebiete*. Das National-Museum besitzt das Weibchen.

* * *

Die Gattungen *Aulacomerus* SPINOLA von *Guyana*, *Cercalces* KIRBY und *Phylactophaga* FROGG. von *Australien* sowie *Paralyppia* KIRBY von *Brasilien* sind mir bisher nicht bekannt geworden.

(Separatim editum est die 1. Novembris 1900.)